

# ไวรัสฮันตา

## ภัยพิบัติจาก 'หนู'

**โรคติดเชื้อไวรัสฮันตา (Hantavirus Disease)**  
เป็นโรคติดต่อจากกลุ่ม RNA ในตระกูล Hantaviridae  
ซึ่งพบได้ใบสัตว์ฟันแทะและสามารถติดต่อสู่คน  
จนเป็นอันตรายถึงชีวิต

**ยังไม่พบ!!  
การระบาด...  
ในประเทศไทย**


### อาการหลัก 2 กลุ่ม

ระยะฟักตัว 1-8 สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่มีนิมิตอาการภายใน 1-2 สัปดาห์

#### 1 กลุ่มอาการทางไต (HFRS)

พบมาก : เอเชีย และยุโรป

อาการ : ไข้สูง ปวดศีรษะ  
จุดเลือดออกใต้ผิวหนัง  
และอาจมีไตวายเฉียบพลัน



#### 2 กลุ่มอาการทางปอด (HPS)

พบมาก : อเมริกา

อาการ : ไข้ ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง  
น้ำท่วมปอด หายใจลำบาก  
(อันตรายถึงชีวิต)



### การติดต่อ



#### สูดดมฝุ่นละออง

ที่มีปัสสาวะ อุจจาระ  
หรือน้ำลายหนูที่แห้งแล้วฟุ้งกระจาย



#### สัมผัสสารคัดหลั่งหนู

แล้วขีตา จมูก ปาก



#### กินอาหาร ที่ปนเปื้อน

หรือถูกหนูที่มีเชื้อกัด (พบได้น้อย)

### วิธีการป้องกัน



เก็บอาหารให้มิดชิด



จัดบ้านให้สะอาด

**อย่าสัมผัส!! สารคัดหลั่งของหนู**  
เช่น ฉี่หนู , น้ำลายหนู ด้วยมือเปล่า

#### ขั้นตอนการทำความสะอาด

- 1 สวมถุงมือ และหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
- 2 หลีกเลี่ยงการกวาดแห้งหรือดูดฝุ่น  
ที่ทำให้ฝุ่นกระจาย
- 3 พรมน้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ  
ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที
- 4 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  
น้ำยาอีกฝ่าขาว หรือน้ำผสมผงซักฟอกอีกครั้ง



แหล่งข้อมูล กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ตรวจฉับเร็ว ตอบโต้ทัน ป้องกันได้

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 พ.ค. 69

แหล่งข้อมูล  
ความ  
โรคและภัยสุขภาพ



แบบประเมิน  
ความรอบ  
รู้ด้านสุขภาพ

